

子宮頸がんワクチン

シルガード®：15歳未満では2回接種か3回接種か選べます。

9歳以上の女性

9歳以上の女性に、1回0.5mLを
合計3回、筋肉内に注射する。



9歳以上の女性に合計3回の接種をする場合、1年内に3回の接種を終了することが望ましい。なお、本剤の2回目及び3回目の接種が初回接種の2カ月後及び6カ月後にできない場合、2回目接種は初回接種から少なくとも1カ月以上、3回目接種は2回目接種から少なくとも3カ月以上間隔を置いて実施すること。

下記年齢においては以下の接種スケジュールも選択可能

9歳以上15歳未満の女性

初回接種から6~12カ月の間隔を
置いた**合計2回**の接種とすること
ができる。



9歳以上15歳未満の女性に合計2回の接種をする場合、13カ月後までに接種することが望ましい。なお、本剤の2回目の接種を初回接種から6カ月以上間隔を置いて実施できない場合、2回目の接種は初回接種から少なくとも5カ月以上間隔を置いて実施すること。

2回目の接種が初回接種から5カ月後未満であった場合、3回目の接種を実施すること。この場合、3回目の接種は2回目の接種から少なくとも3カ月以上間隔を置いて実施すること。

※医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができます。なお、シルガード®9を他のワクチンと混合して接種しないでください。